



G O B I E R N O D E
BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DE SALUD



B.C.S. PANORAMA EPIDEMIOLOGICO DE LA SEMANA 52-2017

MORBILIDAD GENERAL, INFLUENZA PERIODO ESTACIONAL

FUENTE: PLATAFORMA SINAVE. SSA
CORTE DE INFORMACION
RESPONSABLE: DR. MAURICIO E. BERNAL HERNANDEZ
APOYO TECNICO: ING. ERNESTO NAVARRO



MORBILIDAD GENERAL

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD EN BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD
SUBDIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Prontuario semana 52-2017

20 PRINCIPALES CAUSAS DE DX	2017	2016	Variación	Otras (Cafs)*-
Infecciones respiratorias agudas*	248,765	205,630	20.98	87,204
Enfermedades diarreicas agudas**	63,813	46,059	38.55	28,794
Infección de vías urinarias	46,674	41,848	11.53	10,699
Gingivitis y enfermedad periodontal	17,371	15,221	14.13	3,172
Conjuntivitis	14,075	10,190	38.13	5,971
Úlceras, gastritis y duodenitis	13,743	10,025	37.09	5,073
Otitis media aguda	12,887	5,359	140.47	8,431
Obesidad	7,075	7,349	-3.73	399
Vulvovaginitis	5,702	2,783	104.89	2,146
Hipertensión arterial	3,295	3,040	8.39	420
Asma	2,461	2,184	12.68	527
Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)	2,104	2,310	-8.92	209
Insuficiencia venosa periférica	2,004	1,055	89.95	251
Varicela	1,964	3,003	-34.60	194
Otras helmintiasis	1,613	2,502	-35.53	12
Depresión	1,084	847	27.98	267
Quemaduras	1,025	1,403	-26.94	71
Hiperplasia de la próstata	854	708	20.62	43
Accidentes de transporte en vehículos con motor	692	831	-16.73	3
Desnutrición leve	558	705	-20.85	35
Total :	462,080	390,458	18.34	154,343

Fuente: EPIMORBI-SUAVE.

CORTE INF. 04-01-2018

*Incluye: infección respiratoria aguda, faringitis, amigdalitis estreptocócica, neumonía, bronconeumonía e influenza.

**Incluye: amebiasis intestinal, shigelosis, fiebre tifoidea, giardiasis, enfermedad diarreica aguda, intoxicación alimentaria bacteriana, paratifoidea, otras salmonelosis y otras infecciones intestinales debidas a protozoarios.

***Incluye: VIH, candidiasis urogenital, herpes genital, infección gonocócica genitourinaria, linfogranuloma venéreo, sífilis adquirida, tricomoniasis urogenital, chancro blando y vulvovaginitis aguda.

Incluye diabetes mellitus tipo 1 y 2.

*- Incluye información de Consultorios Anexos a Farmacia

Nota: información disponible en el sistema de notificación, para el mismo período en ambos años.

Incidencia Estatal de la Influenza

BCS INCIDENCIA DE INFLUENZA POR JURISDICCION SEGÚN RESULTADOS

JURISDICCION	ETI/IRAG	MUESTRA	CONFIRMADOS	TIPO DE VIRUS				INCIDENCIA
				H1N1	H3N2	A	B	
COMONDU	23	18	1	0	1	0	0	1.2
LORETO	4	0	0	0	0	0	0	0
MULEGE	11	9	0	0	0	0	0	0
LA PAZ	109	95	5	0	5	0	0	1.6
LOS CABOS	93	53	6	0	6	0	0	1.8
BCS	239	175	12	0	12	0	0	1.5



INFORMACIÓN DE LA TEMPORADA DE INFLUENZA 2017-2018

Tabla 4. Proporción de casos positivos y defunciones por influenza según entidad federativa. México, Temporada de influenza 2017-2018

Entidad Federativa	Casos ETI/RAG	Casos positivos a influenza	%*	Defunciones por influenza	Entidad Federativa	Casos ETI/RAG	Casos positivos a influenza	%*	Defunciones por influenza
AGUASCALIENTES	487	56	11.5	1	MORELOS	233	6	2.6	0
BAJA CALIFORNIA	214	35	16.4	0	NAYARIT	225	15	6.7	0
BAJA CALIFORNIA SUR	239	12	5.0	0	NUEVO LEÓN	986	18	1.8	0
CAMPECHE	188	0	0.0	0	OAXACA	264	5	1.9	0
COAHUILA	484	82	16.9	1	PUEBLA	489	21	4.3	0
COLIMA	225	24	10.7	0	QUERÉTARO	538	65	12.1	1
CHIAPAS	237	6	2.5	0	QUINTANA ROO	337	7	2.1	0
CHIHUAHUA	344	3	0.9	0	SAN LUIS POTOSÍ	416	61	14.7	0
CIUDAD DE MÉXICO	1,357	158	11.6	1	SINALOA	197	5	2.5	0
DURANGO	178	18	10.1	0	SONORA	140	12	8.6	0
GUANAJUATO	224	11	4.9	2	TABASCO	263	4	1.5	0
GUERRERO	330	24	7.3	0	TAMAULIPAS	118	10	8.5	0
HIDALGO	471	22	4.7	2	TLAXCALA	642	45	7.0	2
JALISCO	490	27	5.5	2	VERACRUZ	901	25	2.8	0
ESTADO DE MÉXICO	945	73	7.7	0	YUCATÁN	223	19	8.5	1
MICHOACÁN	359	14	3.9	0	ZACATECAS	653	29	4.4	0
					Total general	13,397	912	6.8	13

*% de casos positivos a influenza respecto a los casos ETI/RAG

Fuente: SINAVE/DGE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza, acceso al 11/1/2018.



REPORTE NACIONAL DE EDAS 2017



Información hasta la semana
epidemiológica 52 del 2017

Información relevante

Tabla 1:

En la semana epidemiológica 52, 8 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 8 principales:

- Baja California (42.9 %)
- Sinaloa (15.4 %)
- Chihuahua (11.1 %)
- Veracruz (8.3 %)
- Jalisco (7.7 %)
- Colima (6.7 %)
- Quintana Roo (5.0 %)
- Zacatecas (4.5 %)

Figura 1:

La entidad federativa con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 52 es:

Distrito Federal (5.3)

En 8 de las 32 entidades federativas

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años desde la semana 48 hasta la semana 52, por entidad federativa, México 2017.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	48	49	50	51	52		48	49	50	51	52
Aguascalientes	2.3	2.5	2.0	1.7	1.4	Morelos	1.0	1.8	1.4	1.6	1.4
Baja California	1.8	1.6	1.6	0.7	1.0	Nayarit	1.7	1.5	1.3	1.5	1.2
Baja California Sur	2.0	1.9	2.1	1.9	1.6	Nuevo León	2.4	2.1	1.7	1.5	1.3
Campeche	2.6	2.3	2.1	2.2	2.1	Oaxaca	1.5	1.3	1.4	1.3	1.0
Coahuila	1.9	2.0	1.2	1.2	1.1	Puebla	1.3	1.2	1.2	0.9	0.8
Colima	1.8	2.1	1.8	1.5	1.6	Querétaro	1.7	1.7	1.3	1.7	1.4
Chiapas	1.6	1.6	1.2	1.1	1.0	Quintana Roo	2.7	2.8	1.9	2.0	2.1
Chihuahua	1.6	1.3	1.1	0.9	1.0	San Luis Potosí	1.6	1.7	1.3	1.3	1.2
Distrito Federal	2.1	6.0	5.3	5.8	5.3	Sinaloa	1.8	1.9	1.8	1.3	1.5
Durango	1.6	1.6	1.1	1.0	1.0	Sonora	1.9	2.0	1.7	1.2	1.1
Guanajuato	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	Tabasco	2.3	2.1	1.6	1.4	1.2
Guerrero	1.0	1.2	1.1	0.8	0.7	Tamaulipas	3.3	3.0	2.7	2.6	2.4
Hidalgo	1.3	1.5	1.1	1.1	1.1	Tlaxcala	2.2	2.3	1.7	2.1	1.9
Jalisco	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	Veracruz	1.6	1.5	1.4	1.2	1.3
México	1.5	1.6	1.4	1.2	1.0	Yucatán	5.1	5.5	1.9	1.7	1.7
Michoacán	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	Zacatecas	2.5	2.4	2.0	2.2	2.3
						Nacional	1.8	1.9	1.6	1.5	1.4

Figura 1. Incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 52, México, 2017.



Gráfica 1. Casos notificados de EDA, México 2012 - 2017.